

HEPATITE E

UNE MALADIE DU FOIE SOUS-DIAGNOSTIQUÉE

- **Non différenciable cliniquement des autres types d'hépatite aiguë**
- **CONTAMINATION:**
 - Par ingestion de viande crue ou insuffisamment cuite : porcs, cerfs, sangliers (pays industrialisés)
 - Par voie féco-orale (pays en développement)
- **PÉRIODE D'INCUBATION: 4 à 6 semaines**
- **SYMPTÔMES: fièvre, douleurs abdominales, nausées, vomissements**
- **SÉVÉRITÉ:**
 - Habituellement peu sévère (hépatite aiguë ictérique)
 - Infection asymptomatique jusqu'à la forme fulminante

SUSPICION D'HÉPATITES AIGÜES VIRALES?

PENSEZ A, B, C & E

EXAMEN A PRESCRIRE: Sérologie hépatite E - IgM

réalisé sur notre plateau technique

En première intention en cas d'**hépatite aiguë**

Patients avec des signes cliniques ou symptômes d'hépatite

En cas d'élévation des aminotransférases



DOSAGE HEPATITE E- IgM

Réalisé sur notre plateau technique

- **Technique utilisée :**
 - Enzympologie immunologique (Biomérieux)

- **Intérêt clinique :**
 - Diagnostic d'une infection aiguë par le VHE

- **Réalisation :**
 - Tous les jours

- **Prélèvements**
 - Examen sanguin non à jeûn
 - Dans nos laboratoires : 43 sites sur Lyon et sa région

DYOMEDEA NEOLAB – Biologie Médicale
Siège social : 480 avenue Ben Gourion 69009 LYON
www.dyomedea.eu

**GARDE
24H/24**